


Rhinopneumonie – Hoe bescherm ik mijn paard?

Op social media en in het nieuws is op het moment veel te doen over de uitbraak van **Rhinopneumonie** bij sportpaarden op het concours in Valencia, Spanje. Aangezien we veel vragen krijgen van bezorgde paardeneigenaren hieronder enige toelichting en onze adviezen. Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Rhinopneumonie is een besmettelijke infectie, veroorzaakt door het **Equine herpesvirus (EHV-1/EHV-4)**. Herpesvirussen hebben de typische eigenschap om na infectie slapend in het paard aanwezig te blijven. We zien het bijvoorbeeld ook bij de koortsloop bij de mens. Dit mechanisme van slapend dragerschap speelt een cruciale rol in het onderhouden en verspreiden van EHV-1 en EHV-4.


Wanneer een paard eenmaal besmet is, kan het equine herpesvirus levenslang aanwezig blijven. Bijna alle paarden zijn hierdoor drager. Ze vertonen geen klinische symptomen, maar de infectie kan te allen tijde gereactiveerd worden met uitscheiding en verspreiding van virus naar andere paarden.



De klinische symptomen van rhinopneumonie zijn heel variabel. Het zijn vooral jonge paarden die **griepachtige symptomen** kunnen vertonen, terwijl de infectie bij oudere paarden eerder onopgemerkt verloopt met mogelijk **suboptimale prestaties** tot gevolg. Bij een drachtige merrie kan EHV-1 het leven van het veulen ernstig in gevaar brengen. Dit virus is de meest voorkomende oorzaak van infectieuze **abortus**. In zeldzame gevallen kan rhino eveneens tot een aantasting van het zenuwstelsel leiden met ataxie (wankel lopen) en de gevreesde **verlamningsverschijnselen** tot gevolg.

Door uw paard regelmatig te **vaccineren**, behoudt hij een vrij goede weerstand tegen het virus. Zo is hij zelf beter beschermd tegen de ziekte, maar zal hij ook minder virus uitscheiden naar andere paarden en de verspreiding van virus verminderen. Hieronder staan 2 vaccinatieschema's: het bovenste voor (sport)paarden en daar onder het schema voor drachtige merries.


VACCINATIESCHEMA Equip® EHV_{1,4}



TIPS:

- Start met vaccineren op de leeftijd van 5 à 6 maanden.
- Zorg ervoor dat uw paard een goede algemene gezondheid heeft als het gevaccineerd wordt.
- Ga er van uit dat uw paard een paar dagen niet helemaal lekker is na vaccinatie. Het afweersysteem is druk bezig alsof er een echte besmetting aan de gang is.
- Vaccineer alle paarden op stal voor een maximale doeltreffendheid.

Ter verkleining van abortusrisico



RAADPLEEG UW DIERENARTS!

Wilt u graag meer weten over rhinopneumonie? Ga dan naar www.rhinobijpaarden.nl

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie, neem dan contact op met de praktijk.

Vriendelijke groeten,

Team Dierenartsenpraktijk Noord Oost Twente