



Nieuwsbrief April 2019

Dankzij het mooie lenteweer van de afgelopen dagen lopen de eerste melkkoeien inmiddels weer op de weide. Een prachtig gezicht! Om het optimale rendement te halen uit het weideseizoen voor zowel melkvee als jongvee hebben wij voor u de ideale voorbereiding op een rijtje gezet. Tijdig de juiste maatregelen treffen is niet alleen effectiever maar kan economisch gezien zeker voordeel opleveren.

Het onderwerp van het tweede item in deze nieuwsbrief zal u vast niet zijn ontgaan: de kalveropfok. Te hoge kalversterfte binnen de melkveehouderij heeft de afgelopen dagen volop in het nieuws gestaan. Erg jammer dat de sector hierdoor negatief wordt belicht, ondanks dat onze veehouders hun uiterste best doen om vitale kalveren groot te brengen. Om hierbij de laatste puntjes op de 'i' te zetten in dit item een kort overzicht van mogelijke management opties voor topfitte kalveren: onze toekomstige melkkoeien!

Als laatste punt in deze nieuwsbrief willen wij nogmaals kort benadrukken dat er sinds enige tijd de mogelijkheid bestaat van digitale facturatie. Dit bespaart niet alleen u, maar zeker ook de boekhouder en de praktijk een hoop werk.

Inhoud nieuwsbrief



Weidegang

- Vliegenbestrijding
- Longworm vaccinatie
- Mineralenvoorziening
- Ontworming

Kalveropfok

- Media-aandacht
- Aandachtspunten

Communicatie

- Digitale facturatie
- Mail GezondheidsDienst

****Extra bericht: situatie Blauwtong****


Weidegang

Om het optimale rendement uit weidegang te halen voor zowel melkvee als ook jongvee is het van belang om de nodige preventieve maatregelen te nemen. Dit kan achtereenvolgens door tijdig te starten met vliegenbestrijding, het jongvee indien nodig te vaccineren tegen longworm, alle dieren van voldoende mineralen te voorzien en door een goed ontwormschema.

Vliegenbestrijding

Richting de warme zomerperiode groeit ook de populatie vliegen. Vliegen zorgen voor onrust bij het vee, brengen ziektekiemen over en zorgen hiermee voor productieverliezen.

Het is daarom erg belangrijk om **tijdig te starten met de vliegenbestrijding**. Dit houdt in dat er al gestart dient te worden vóórdat er daadwerkelijk overlast ontstaat. In onderstaande grafiek is dit goed te zien. Praktisch houdt dit in dat u al dient te behandelen vanaf de eerste week van april. Hiermee blijft het aantal vliegen beperkt tot een acceptabele populatie en kunt u het met herhaaldelijke behandelingen de gehele zomer onder controle houden.



1. Om het behandelen van de gehele koppel snel en eenvoudig uit te voeren is nu de zogenaamde Farmpack beschikbaar bij een 2,5 liter verpakking Deltanil pour-on. Deze handige rugzak inclusief doseerpistool maakt behandelen nog eenvoudiger.

Bovendien is Deltanil 5 jaar houdbaar (2 jaar na openen), waardoor u de rugzak na gebruik op kunt bergen en bij een volgende behandeling direct van start kunt gaan. Deltanil bevat dezelfde werkzame stof als het bekendere Butox, maar is al bij een lagere concentratie werkzaam door de toevoeging van hulpstoffen. Hierdoor werkt het net zo goed, maar is het ook voor u veel voordeliger.

Aanbieding:

1 Flexibag van 2,5 liter Deltanil (goed voor 250 doseringen rund)
met een Farmpack voor €165,- ex BTW.

Geef voor 31 mei uw bestelling door via:

info@dapnot.nl of bel 0541-352268

Bevindt u zich in een risicogebied wat betreft teken (denk hierbij aan uitscharen in bijvoorbeeld natuurgebieden)? Dan is Tectonik het enige pour-on middel dat naast vliegen ook werkzaam is tegen teken.

2. Een andere optie in het kader van vliegenbestrijding is het toepassen van oorflappen (Auriplak). Hierbij willen we wel benadrukken dat een goede werkzaamheid pas aangetoond is wanneer er een oorflap aan beide oren is bevestigd. De werkzaamheid berust namelijk op het contact met de huid, waardoor bij eenzijdige toepassing slechts een deel van het dier beschermd is. Oorflappen zijn 4 maanden werkzaam.
3. Bestrijding van de resterende vliegenpopulatie in de stal kan het beste worden gedaan middels smeer- en strijkmiddelen. Madendood wordt ook nogal eens toegepast, maar blijkt in rundveemest of potstal (ook de strostal van de kalveren) slechts matig actief. Het mixen van de mest heeft ook een positieve invloed. Tijdens het melken of voor kortdurende bestrijding kan gebruik worden gemaakt van spuitmiddelen (zoals bijvoorbeeld Veerust).



Longworm vaccinatie

Jongvee kan vanaf een leeftijd van 6 weken worden gevaccineerd tegen longworm (oraal in te geven vaccin). De vaccinatie bestaat uit een tweevoudige toediening met een interval van 4 weken. De eerste vaccinatie moet 6 weken voorafgaand aan de geplande weidegang worden gegeven. Neem hiervoor contact op met de praktijk, zodat er tijdig vaccin voor u besteld kan worden.

Mineralenvoorziening

In de stalperiode is het eenvoudig om gericht mineralen te verstrekken om optimale groei en vruchtbaarheid te garanderen. In de weideperiode is dit niet zo eenvoudig, met name voor het jongvee, dat vaak langdurig buiten loopt. Optioneel is het verstrekken van mineralen via bijvoorbeeld een likemmer, maar voldoende opname door elk dier is hierbij niet gegarandeerd. Daarom adviseren wij met name bij het jongvee om aan het begin van de weideperiode mineralenbolussen in te geven, waardoor langdurige afgifte van mineralen tijdens het gehele weideseizoen verzekerd is.

Ontworming

Om groeiachterstand ten gevolge van een wormbesmetting te voorkomen is het verstandig om de dieren die weidegang krijgen te ontwormen. Dit kan eenvoudig middels toediening van een ontworm-bolus bij het begin van de weideperiode, via een onderhuidse injectie of door middel van een pour-on. Voor jongvee adviseren wij het gebruik van een ontworm-bolus, vanwege de eenvoudige toediening en de gegarandeerde, lange werkingsduur. De noodzaak van het herhalen van ontworming tijdens of na het weideseizoen is sterk afhankelijk van de beweidsduur, het type beweiding (omweiden of standweiden) en de besmettingsgraad van het grasland. Voor een advies op maat kunt u dit bespreken met uw dierenarts.

Situatie Blauwtong

In verband met de recente ontwikkelingen met betrekking tot Blauwtong willen wij u wijzen op de mogelijkheid tot vaccinatie van uw rundvee. In België én Duitsland is eind maart 2019 een uitbraak van Blauwtong type 8 (BTV-8) vastgesteld. Het risico op introductie van dit virus in Nederland neemt hierdoor toe, met alle bijkomende gevolgen. Bij melkvee zijn de verschijnselen van een blauwtong-infectie: koorts, melkproductie daling, verminderde vruchtbaarheid en geboorte van kalveren met hersenafwijkingen. Naast vaccinatie is vliegenbestrijding in het kader van Blauwtong extra belangrijk, de ziekte wordt namelijk door kleine vliegjes overgebracht. Bespreek dit met uw begeleidende dierenarts.

Kalveropfok

Media-aandacht

De hetze in de media rondom de kalversterfte zal u vast niet zijn ontgaan. Schrijnende gevallen en generaliserende negatieve uitspraken over de veehouderij waren nationaal nieuws. Erg jammer dat een vooruitstrevende sector zo in het nieuws wordt gebracht. Ondanks de grote inzet van onze veehouders om vitale kalveren groot te brengen willen we toch hieronder kort aandacht schenken aan enkele punten voor een succesvolle kalveropfok. Want de kalveren van nu zijn de melkkoeien van de toekomst!

Aandachtspunten

De geboorte van sterke, vitale kalveren begint al in de droogstand. Let hierbij op de volgende zaken:

- Speciaal samengesteld droogstandsrantsoen met transitiebrok, mineralen en voldoende eiwit;
- Optimale huisvesting van de droge koeien (ruime, comfortabele ligplekken en voldoende voer/water);
- Goede conditie van de droge koeien (BCS: 3-3,5);
- Dieren met een body condition score >3,5 ondersteunen met Kexxtone bolus;
- Vaccineren van droge koeien overwegen om kalverdiarree ten gevolge van rotavirus/coronavirus/E.coli tegen te gaan (Rotavec/Bovigen scour).

Na het afkalven is de biestperiode van cruciaal belang voor de opbouw van voldoende weerstand:

- Kalf direct scheiden van de koe;
- 3-4 liter biest binnen 2 uur na geboorte;
- 6-8 liter biest in de eerste 12 uur;
- Meet de biestkwaliteit (vooral wanneer u biest invriest).

Bespreek met uw begeleidende dierenarts het ideale jongvee-opfok schema. Tijdens dit gesprek wordt onder andere aandacht geschonken aan de richtlijnen qua voeding en huisvesting. Uit meerdere onderzoeken komt immers naar voren dat een goede jongvee-opfok resulteert in beduidend betere vaarzen (duidelijk hogere productie en langere levensduur).

Kortom, investeren in goede kalveropfok betaalt zich dubbel en dwars terug!

Communicatie

Digitale facturatie

Sinds enige maanden is er de mogelijkheid van een digitale rekening. U ontvangt uw rekening dan via de mail en niet meer per post. Indien u interesse heeft kunt u hiervoor uw mailadres opgeven. Deze kan/mag afwijken van de mail waarop u normaliter de visitebrieven ontvangt. Graag even duidelijk aangeven welk mailadres u waarvoor wilt gebruiken.

Mail GezondheidsDienst

De GD is overgestapt naar digitale aansturing van onderzoeken. Waar u voorheen nog post ontving over de uit te voeren onderzoeken, wordt dit tegenwoordig enkel nog digitaal aangestuurd. Houdt hiervoor uw e-mail (ook ongewenste mail/spam) goed in de gaten en kijk regelmatig op de site van de GD (veeonline.nl). Hiermee voorkomt u het missen van onderzoeken en het verlopen van bijvoorbeeld uw BVD of IBR status.
