



Nieuwsbrief December 2018

Na een warm, droog jaar is eindelijk de winter ingetreden. De weersomslag heeft de nodige invloed op het presteren van uw vee. In deze nieuwsbrief daarom de nodige tips om ook dit seizoen goed door te komen.

Want goede prestaties beginnen bij een preventieve aanpak!

Inhoud nieuwsbrief



Jongvee

- Preventieve maatregelen
- Bloedonderzoek
- Bescherming pinkengriep

Melkonderzoek

- Doorlooptijd
- Nemen melkmonster
- Mastitis vs Hoogcelgetal

WhatsApp

- Eenvoudig
- Snel
- Duidelijk

Jongvee

Preventieve maatregelen

Bij koude weersomstandigheden is het belangrijk om extra aandacht aan uw jongvee te besteden. Met name de jongste kalveren zijn extra energie nodig om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Energie die niet besteed kan worden aan groei en het in stand houden van een goede afweer. Juist in deze periode zijn de kalveren extra gevoelig voor infecties van bijvoorbeeld de luchtwegen. In combinatie met het opstallen kan bijvoorbeeld pinkengriep dan de kop opsteken.

Om de kalveren in deze periode van extra energie te voorzien is het advies om via het rantsoen 10 procent extra energie te verstrekken. Dit kan door de kalvermelk geconcentreerder te maken (meer melkpoeder per liter water) of door meer melk te verstrekken van dezelfde concentratie. Daarnaast is het belangrijk dat de kalveren altijd de beschikking hebben over vers drinkwater, zelfs wanneer het vriest.

Om de extra vraag naar energie (voor het warmhouden) te beperken, is het belangrijk dat de dieren een warm en droog ligbed hebben. Voldoende vaak opstrooien is dus een vereiste. Daarnaast moet de huisvesting vanzelfsprekend vrij zijn van tocht.

Een erg effectieve toevoeging is de inzet van kalverdekjes/-bodywarmers. Hierdoor treedt er significant minder warmteverlies op. De opgenomen energie kan dan maximaal worden benut voor groei en weerstand met gezonde, sterke kalveren tot gevolg. De kalverdekjes zijn via de praktijk verkrijgbaar.

Bloedonderzoek

Indien er ondanks alle preventieve maatregelen toch luchtwegproblemen optreden, is het zaak om de oorzakelijke kiemen in beeld te brengen. Alleen via deze weg kan er gericht (preventief) gehandeld worden.

Zoëtis biedt daarom dit jaar tegen gereduceerd tarief bloedonderzoek aan naar de meest voorkomende kiemen. Vraag naar de mogelijkheden bij uw dierenarts of neem hiervoor contact op met de praktijk.

Bescherming pinkengriep

Wanneer de oorzakelijke kiemen in beeld zijn gebracht kan het zinvol zijn om uw kalveren te vaccineren (bijvoorbeeld tegen pinkengriep). Hiervoor zijn verschillende vaccins geregistreerd, waarbij op z'n vroegst al op dag 9 gevaccineerd kan worden voor bescherming op jonge leeftijd. Voor advies op maat en gerichte inzet van een dergelijke vaccinatie kunt u dit bespreken met uw begeleidende dierenarts.

Melkonderzoek

Doorlooptijd

Het bacteriologisch onderzoek van (mastitis) melk en eventueel de hierbij behorende gevoeligheidsbepaling (antibiogram) kan zoals bekend bij ons op de praktijk worden uitgevoerd. Wanneer de monsters 's ochtends worden ingezet, kunnen wij meestal de volgende dag aangeven welke kiem verantwoordelijk is voor de mastitis of het hoge celgetal. De dag erna krijgt u dan ook de uitslag van de gevoeligheidsbepaling, zodat u gericht kunt behandelen. Met name bij hoog celgetal dieren is het vaak raadzaam om op basis van de gevoeligheidsbepaling te behandelen, aangezien dit een beter resultaat oplevert en er hierbij meestal geen sprake is van spoed.

Nemen melkmonster

Om teleurstelling te voorkomen is het erg belangrijk om de melkmonsters secuur af te nemen. Bij verontreiniging (mengflora) kunt u namelijk niets met de uitslag en is het daarnaast niet mogelijk om een gevoeligheidsbepaling in te zetten. In het kort gelden de volgende richtlijnen:

1. Werk met schone handschoenen;
2. Maak uier en speen schoon met een uierdoek;
3. Melk minimaal 3 stralen weg;
4. Ontsmet de speenpunt met een alcoholdoekje totdat er geen vuil meer op het doekje zit;
5. Melk 3 stralen weg;
6. Melk indien mogelijk in 1 straal het melkbuisje vol, zorg er hierbij voor dat er geen vuil in het buisje komt;
7. Sluit het buisje en vermeldt op het buisje koenummer en kwartier. Bij het inleveren graag vermelden wanneer het monster genomen is, of het is ingevroren en of het om mastitismelk of hoogcelgetal melk gaat.
8. LET OP: m.b.t. het nemen van hoogcelgetal-monsters op robotbedrijven is het noodzakelijk om het monster te nemen voor het robotbezoek of minimaal 6 uur er na.

N.B. Op YouTube kunt u zoeken naar 'Hoe neem ik een melkmonster?'. Dit praktische instructiefilmpje van de GD geeft bovenstaande stappen gedetailleerd weer. Klik hier voor een directe link: <https://www.youtube.com/watch?v=YGaT9gebyjU>

Mastitis vs Hoogcelgetal

Met betrekking tot het brengen van melkmonsters geldt hierbij grofweg het volgende:

1. Klinische mastitis – melkmonster mag elke werkdag van de week gebracht worden en wordt dan direct ingezet.
2. Hoogcelgetal (MPR) waarvan nog niet duidelijk is welk kwartier verhoogd is van alle kwartieren een monster nemen en niet invriezen! Deze monsters mogen elke werkdag ingeleverd worden. Wanneer u de monsters voor 11:30 uur inlevert wordt dezelfde dag nog het celgetal bepaald.
3. Hoogcelgetal koe, waarvan duidelijk is welk kwartier (1 monster) mag u deze invriezen. Graag deze monsters inleveren op maandag, dinsdag of woensdag. Wanneer u de monsters voor 11:30 uur inlevert worden deze dezelfde dag nog ingezet.

WhatsApp

Zoals bij velen inmiddels bekend en ook aangekondigd in voorgaande nieuwsbrief is er de mogelijkheid voor het bestellen van medicijnen via de praktijk WhatsApp. Deze mogelijkheid willen we hierbij nogmaals kort benadrukken.

U kunt uw bestelling via WhatsApp sturen naar het volgende telefoonnummer:

06-82199474

Dit mobiele nummer is enkel bedoeld voor het bestellen van medicijnen via WhatsApp en wordt beheerd door onze assistentes. De apps worden uitsluitend gelezen van maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Voor overige vragen, advies of het doorgeven van visites kunt u bellen met ons vaste nummer:

0541-352268

Met betrekking tot het klaarleggen van medicijnen in de kast geldt het volgende:

Medicijnen besteld vóór 9.30 uur staan na 11.00 uur in de kast.

Medicijnen besteld na 9.30 uur staan na 20.00 uur in de kast.