


Nieuwsbrief

Maart 2018



Antibioticagebruik bij mastitis en droogzetten

In de vorige nieuwsbrief (december 2017) was een artikel te lezen over de indeling van verschillende typen mastitis en de keuze voor de juiste behandeling. Onderweg merken wij toch dat er vaak nog gestart wordt met een 2^e-keuze injector, zonder dat er melkonderzoek wordt uitgevoerd. Ook wordt er met een 2^e-keuze injector behandeld in gevallen die volgens het protocol met een 1^e-keuze injector behandeld zouden moeten worden.

In het kader van de antibiotica-reductie is de NVWA hierop gaan controleren. In de praktijk zijn er dan ook al forse boetes uitgedeeld aan veehouders én dierenartsen, wanneer er sprake was van onrechtmatige inzet van 2^e-keuze middelen. Daarom willen wij u er via deze weg nogmaals op wijzen dat er bij milde mastitis gestart moet worden met een 1^e-keuze injector. Daarnaast het advies om voorafgaand aan de behandeling alvast een melkmonster te nemen. Dit melkmonster kunt u in de diepvries bewaren voor bacteriologisch onderzoek op een later tijdstip. Dit om een bedrijfshistorie op te bouwen en om in de toekomst gericht te kunnen (be)handelen. U kunt dan bijvoorbeeld meerdere monsters opsparen en deze in één keer laten onderzoeken op de praktijk.

Om het nemen van melkmonsters en het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek te stimuleren is Boehringer Ingelheim gestart met het UbroCare programma (www.ubrocare.nl). Hiervoor is via de praktijk de zogenaamde UbroBox gratis te verkrijgen (zolang de voorraad strekt). In deze box bevinden zich alle materialen en instructies om op een goede, hygiënische manier een melkmonster te nemen. Indien u hierin interesse heeft kunt u contact opnemen met de praktijk.



Naast mastitis-injectoren geldt het gericht inzetten van antibiotica ook voor het gebruik van droogzetters. Er mag enkel selectief worden drooggezet (celgetal vaarzen >150.000; koeien >50.000). Daarnaast kunnen droogzetters worden ingezet bij een verhoogde geleidbaarheid of afwijkende CMT test (vierkwartieren schaal). In de praktijk blijkt dit erg goed mogelijk. Droogzetten bij een lage melkgift (<12 liter) en hygiënisch werken, in combinatie met het gebruik van een teatsealer (Orbeseal/Noroseal) kan voor een probleemloze droogstand zorgen.

VKI-melding

Bij de afvoer van een rund voor de slacht moet het formulier VoedselKetenInformatie (VKI) slachtrunderen worden ingevuld. Dit formulier is bedoeld om de voedselveiligheid van het te slachten dier te garanderen. Op dit formulier moet alle medicatie worden ingevuld die in de afgelopen periode aan het dier zijn verstrekt. Via deze nieuwsbrief willen we benadrukken dat het niet alleen medicatie met een wachttijd voor vlees betreft, maar dat het daadwerkelijk om alle medicatie gaat (zoals bijvoorbeeld ook calcium-magnesium infuus of catosal). Op het slachthuis wordt namelijk gekeken naar spuitplekken en indien er bij een spuitplek geen logische verklaring op het VKI-formulier te vinden is, bestaat de mogelijkheid dat het dier wordt afgekeurd of dat er een boete volgt. Dit is niet bedoeld om u als veehouder nog meer werk te bezorgen, maar om de voedselveiligheid te kunnen garanderen. Dus nogmaals het dringende advies om alle medicatie (inclusief uierinjectoren) correct op het VKI-formulier te vermelden, om teleurstelling te voorkomen.