

Bent u klaar voor het weideseizoen?



Door de ernstige situatie rondom het Corona virus zou u het bijna vergeten, het wordt weer lente en dat betekent dat het (melk)vee binnenkort weer naar buiten kan.


Daarom is dit het tijdstip om preventief aan de slag te gaan om het optimale rendement uit het weideseizoen te halen!

Vliegenbestrijding

Richting de warme zomerperiode groeit ook de populatie vliegen. Vliegen zorgen voor onrust bij het vee, brengen ziektekiemen over en zorgen hiermee voor productieverliezen.

Het is daarom erg belangrijk om tijdig te starten met de vliegenbestrijding. Dit houdt in dat er al gestart dient te worden vóórdat er daadwerkelijk overlast ontstaat. In onderstaande grafiek is dit goed te zien. Praktisch houdt dit in dat u al dient te behandelen vanaf de eerste week van april. Hiermee blijft het aantal vliegen beperkt tot een acceptabele populatie en kunt u het met herhaaldelijke

behandelingen de gehele zomer onder controle houden.



1. Om het behandelen van de gehele koppel snel en eenvoudig uit te voeren is nu de zogenaamde Farmpack beschikbaar bij een 2,5 liter verpakking Deltanil pour-on. Deze handige rugzak inclusief doseerpistool maakt behandelen nog eenvoudiger. Bovendien is Deltanil 5 jaar houdbaar (2 jaar na openen), waardoor u de rugzak na gebruik op kunt bergen en bij een volgende behandeling direct van start kunt gaan. Deltanil bevat dezelfde werkzame stof als het bekendere Butox, maar is al bij een lagere concentratie werkzaam door de toevoeging van hulpstoffen. Hierdoor werkt het net zo goed, maar is het ook voor u veel voordeliger. Bevindt u zich in een risicogebied wat betreft teken (denk hierbij aan uitscharen in bijvoorbeeld natuurgebieden)? Dan is Tectonik het enige pour-on middel dat naast vliegen ook werkzaam is tegen teken.

2. Een andere optie in het kader van vliegenbestrijding is het toepassen van oorflappen (Auriplak). Hierbij willen we wel benadrukken dat een goede werkzaamheid pas aangetoond is wanneer er aan beide oren een oorflap is bevestigd. De werkzaamheid berust namelijk op het contact met de huid, waardoor bij eenzijdige toepassing slechts een deel van het dier beschermd is. Oorflappen zijn 4 maanden werkzaam.

3. Bestrijding van de resterende vliegenpopulatie in de stal kan het beste worden gedaan middels smeer- en strijkmiddelen. Madendood wordt ook nogal eens toegepast, maar blijkt in rundveemest of potstal (ook de stotal van de kalveren) slechts matig actief. Het mixen van de mest heeft ook een positieve invloed. Tijdens het melken of voor kortdurende bestrijding kan gebruik worden gemaakt van spuitmiddelen (zoals bijvoorbeeld Veerust).

Aanbieding:

1 Flexibag van 2,5 liter Deltanil (goed voor 250 doseringen rund)
met een Farmpack voor €167,95 ex BTW.

Geef voor 31 mei uw bestelling door via:

info@dapnot.nl of bel **0541-352268**

Mineralenvoorziening

In de stalperiode is het eenvoudig om gericht mineralen te verstrekken om optimale groei en vruchtbaarheid te garanderen. In de weideperiode is dit niet zo eenvoudig, met name voor het jongvee, dat vaak langdurig buiten loopt. Optioneel is het verstrekken van mineralen via bijvoorbeeld een likemmer, maar voldoende opname door elk dier is hierbij niet gegarandeerd. Daarom adviseren wij met name bij het jongvee om aan het begin van de weideperiode mineralenbolussen in te geven, waardoor langdurige afgifte van mineralen tijdens het gehele weideseizoen verzekerd is.



Ontworming

Om groeiachterstand ten gevolge van een wormbesmetting te voorkomen is het verstandig om de dieren die weidegang krijgen te ontwormen. Dit kan eenvoudig middels toediening van een ontworm-bolus bij het begin van de weideperiode, via een onderhuidse injectie of door middel van een pour-on. Voor jongvee adviseren wij het gebruik van een ontworm-bolus, vanwege de eenvoudige toediening en de gegarandeerde, lange werkingsduur. De noodzaak van het herhalen van ontworming tijdens of na het weideseizoen is sterk afhankelijk van de beweidingduur, het type beweiding (omweiden of standweiden) en de besmettingsgraad van het grasland. Voor een advies op maat kunt u dit bespreken met uw dierenarts.

Longworm vaccinatie

Jongvee kan vanaf een leeftijd van 6 weken worden gevaccineerd tegen longworm (oraal in te geven vaccin). De vaccinatie bestaat uit een tweevoudige toediening met een interval van 4 weken. De eerste vaccinatie moet 6 weken voorafgaand aan de geplande weidegang worden gegeven. Neem hiervoor contact op met de praktijk, zodat er tijdig vaccin voor u besteld kan worden.