


Nieuwsbrief

September 2017



De herfst is in aantocht!

De R zit weer in de maand en ondanks de prachtige nazomerdagen betekent dit de komst van wisselvallig weer. Wisselende temperaturen, neerslag en wind zijn kenmerkend voor de herfst en vormen hiermee een risicoperiode voor uw (jong)vee. **Pinkengriep** is een vervelende aandoening die in deze periode de kop opsteekt en zorgt voor **zieke dieren**, **groeiachterstand** en **uitval**.

**Vaccineer tijdig tegen pinkengriep
en bescherm uw toekomstige
melkkoe!**

Om uw dieren tegen pinkengriep te beschermen is het daarom aan te raden om nu al te **beginnen met vaccineren**. Ondanks dat de weersomstandigheden nu nog goed zijn moet er gevaccineerd worden vóórdat de verschijnselen optreden.

Vaccineer daarom ruim een maand voor opstallen. Kalveren kunnen middels een neusenting al worden gevaccineerd vanaf 9 dagen leeftijd. Kiest u voor de vaccinatie middels een injectie, dan is het belangrijk om te weten dat dit nu al kan vanaf een leeftijd van 2 weken. Deze vaccinatie dient voor een optimale werking na 4 weken nogmaals herhaald te worden. Dit is vaak prima te combineren met de maandelijkse rundveebegeleiding.

BGP/BBP ondertekenen

...

Middels deze nieuwsbrief willen wij u erop attenderen dat de **bedrijfsgezondheidsplannen én bedrijfsbehandelplannen online ondertekent** moeten worden.

De vraag is of u dit zo spoedig mogelijk wilt doen. Voor informatie of hulp hierbij kunt u contact opnemen met de praktijk.

Verplichte aanpak IBR én BVD in 2018

Begin 2018 wordt er gestart met de landelijke aanpak van IBR en BVD. Welke gevolgen heeft dit voor u, als veehouder, en hoe kunt u dit het beste aanpakken? Dit kunt u hieronder lezen.

IBR

Om IBR binnen de Nederlandse rundveesector uit te roeien is er een **verplicht** vaccinatieprogramma opgesteld. Dit geldt voor elk rundveebedrijf, tenzij er al sprake is van de IBR-status **vrij** of **onverdacht**. Bedrijven die vrij of onverdacht zijn hoeven hun status enkel nog te monitoren. Dit gebeurt via tankmelkonderzoek of bloedonderzoek. Voor bedrijven met vleesvee/vleeskalveren kan dit bloedonderzoek ook worden uitgevoerd aan de slachtlijn.

Bedrijven die niet vrij of onverdacht zijn, dienen dus te **vaccineren**. Dit kan vanaf 3 maanden leeftijd. Vanaf een leeftijd van 15 maanden is het mogelijk om de vaccinatie tegen IBR én BVD in 1 injectie te combineren. Dit bespaart tijd én stress. Bovendien zorgt een hogere gezondheidsstatus (vrij of vaccineren) voor een hogere productie én lagere dierenartskosten.

BVD

Met betrekking tot BVD wordt er door de overheid een beheersprogramma opgesteld. De zuivelondernemingen hebben daarnaast aangekondigd dat zij in hun leveringsvoorwaarden al een verplichte BVD-beheersing opnemen. Dit houdt in dat **BVD-dragers** moeten worden opgespoord en afgevoerd. **Bloedonderzoek** tijdens het onthoornen bij kalveren ouder dan 30 dagen is een eenvoudige optie om dragers op te sporen. Bovendien kunt u bij een positieve uitslag een dergelijk drager-kalf onmiddellijk/op jonge leeftijd afvoeren om verdere infectie binnen uw veestapel te voorkomen. Om het ontstaan van BVD-dragers te verminderen kunt u er daarnaast voor kiezen om uw veestapel te beschermen door te **vaccineren**.

Vaccinatie tegen BVD kan vanaf een leeftijd van 8 maanden middels een injectie. Om de basisvaccinatie te voltooien dient dit met 4 weken nogmaals herhaald te worden. Belangrijk hierbij is dat de tweede vaccinatie minimaal 4 weken voor KI uitgevoerd is, om het ongeboren kalf tegen infectie te beschermen. Vanaf een leeftijd van 15 maanden is, zoals eerder ook al genoemd, de BVD-vaccinatie te combineren met de IBR-vaccinatie in één enkele injectie.

Heeft u vragen met betrekking tot vaccineren, vrij worden of monitoren van de gezondheidsstatus? Neem dan contact op met de praktijk.

Gratis tankmelkonderzoek maagdarmwormen

Dat wormen voor **groeivertraging** en **zieke kalveren** kunnen zorgen weten we allemaal. Dat wormbesmettingen ook verantwoordelijk zijn voor **verlies van melkgift** is minder bekend. En dat terwijl dit toch redelijk veel voorkomt. Het is de koeien echter niet meteen aan te zien dat ze een **wormbesmetting** hebben, maar kan intussen wel zorgen voor een verminderde melkgift en mogelijk verminderde vruchtbaarheid.

Het herkennen van een wormbesmetting:

Bij kalveren zijn de tekenen van een wormbesmetting het meest zichtbaar:

- Dof haarkleed
- Verminderde eetlust en vermagering
- Verminderde weerstand

Behandeling

Voor de behandeling van maagdarmwormen, longwormen en schurft bij melkvee, en ook jongvee, hebben wij een **pour-on** beschikbaar. Deze heeft **geen wachttijd voor melk**, dus een koppelbehandeling is mogelijk. Daarnaast heeft het een brede bescherming tegen wormen, inclusief de ingekapselde wormen, en tegen mijten en luizen.

Aktie

Van **2 oktober tot en met 20 november** kunt u een tankmelkmonster **gratis** laten onderzoeken op **maagdarmwormen**.

Dit monster kan indien gewenst ook onderzocht worden op longworm en leverbot tegen een prijs van € 17,50 per onderzoek.

Wilt u in aanmerking komen voor dit gratis tankmelkonderzoek, neem dan contact op met de praktijk.

Een casus uit de praktijk

Met enige regelmaat worden wij gebeld voor een **koe die niet op kan komen**. Vaak heeft de veehouder zelf al meerdere calcium-magnesium-infusen gegeven maar reageert de koe hier onvoldoende op.

Bij aankomst op het bedrijf treffen wij vaak een liggende koe aan met warme oren, een normale lichaamstemperatuur en een goed functionerende pens. Geen duidelijke verschijnselen van melkziekte, maar toch kan de koe niet op.

Door middel van **eenvoudig bloedonderzoek**, wat wij snel en goedkoop op de praktijk uit kunnen voeren, blijkt vaak dat het **fosforgehalte** in het bloed (ver) **onder de norm** zit. De behandeling bij een dergelijk geval richt zich op het herstellen van het fosforgehalte en het ondersteunen van de stofwisseling. Hiervoor hebben wij verschillende middelen in ons arsenaal. De reactie hierop is over het algemeen goed te noemen en de koeien zijn meestal weer vlot in de benen.

Denk daarom bij een liggende koe die onvoldoende reageert op meerdere calcium-magnesium-infusen eens aan een fosfortekort en laat dit onderzoeken en behandelen door uw dierenarts. Met de alsmaar strenger wordende regelgeving rondom de fosfaatproductie is het niet onwaarschijnlijk dat we in de toekomst steeds vaker dergelijke casussen tegen zullen komen.

Nieuwsbrief september 2017

